

Tabla 10.- TASAS DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS Y HEPATOLIBILIARES: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES y SEXO DE LAS CINCO PRIMERAS CAUSAS : 1995 - 2000 (x 100,000 habitantes)

CIRROSIS HEPATICA :

| EDADES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 50 - +65 | 63.64 | 71.63 | 65.59 | 72.84 | 31.3 | 54.75 |
| 25 - 49 | 7.41 | 8.94 | 8.41 | 7.64 | 4.22 | 5.41 |
| 15 - 24 | 0.57 | 0.58 | 0.81 | 1.11 | 0.23 | 0.43 |
| 06 - 14 | 0.2 | 0.17 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0.15 |
| 01 - 05 | 0.34 | 0.37 | 0.51 | 0 | 0.11 | 0.26 |

TUMOR M. DE ESTOMAGO :

| EDADES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50 - +65 | 66.51 | 59.36 | 66.24 | 65.79 | 63.07 | 65.56 |
| 25 - 49 | 3.65 | 3.65 | 4.49 | 3.84 | 3.96 | 3.85 |
| 15 - 24 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 0.24 |
| 06 - 14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 01 - 05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |

TUMOR M. DE HIGADO Y VIAS BILIARES INTRA HEPATICAS :

| EDADES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 50 - +65 | 24.73 | 20.88 | 23.8 | 0 | 22.11 | 23.03 |
| 25 - 49 | 2.09 | 1.63 | 2.05 | 0 | 1.76 | 1.76 |
| 15 - 24 | 0.64 | 0.59 | 0.77 | 0 | 0.56 | 0.78 |
| 06 - 14 | 0.29 | 0.24 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0.21 |
| 01 - 05 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 0.23 | 0.11 |

TUMOR M. DE PANCREAS :

| EDADES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 50 - +65 | 11046 | 11070 | 11.29 | 11.71 | 11.7 | 12.23 |
| 25 - 49 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.74 |
| 15 - 24 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| 06 - 14 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - 05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |

TUMOR M. DE VESICULA Y VIAS BILIARES INTRA HEPATICAS :

| EDADES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|-------|-------|------|-------|------|------|
| 50 - +65 | 11086 | 11.41 | 11.6 | 11.01 | 4.69 | 6.16 |
| 25 - 49 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.16 | 0.2 |
| 15 - 24 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 06 - 14 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| 01 - 05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |

TUMOR M. DE COLON :

| EDADES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| 50 - +65 | 9.51 | 1013 | 1026 | 1083 | 13.98 | 13.23 |
| 25 - 49 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.72 | 0.74 |
| 15 - 24 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 06 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 01 - 05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DISTRIBUCIÓN POR SEXO:

| | Masculino | Femenina |
|--|-----------------------|----------------------|
| Tumor M. de estómago : | 5.38 - 10.73 (x:9.42) | 4.97 - 9.63 (x:8.58) |
| Tumor M. de hígado y vias biliaresintrahepáticas : | 2.00 - 3.08 (x:2.46) | 2.38 - 4.34 (x:3.08) |
| Tumor M. de Pancreas : | 1.51 - 1.58 (x:1.54) | 1.70 - 2.05 (x:1.85) |
| Tumor M. de Vesícula b. : | 0.99 - 1.50 (x:1.05) | 2.22 - 2.32 (x:2.27) |
| Tumor M. de Cólon : | 0.91 - 1.86 (X:1.38) | 1.14 - 2.20 (X:1.67) |
| Cirrosis hepática | 6.51 - 16.86 (X13.08) | 2.97 - 8.02 (X 6.20) |