

HEPATITIS C EN EL PERU

En el presente número de la revista de Gastroenterología del Perú se reporta un interesante Estudio sobre la prevalencia de infección por el virus de hepatitis C en donantes de sangre, información que fue recogida del Programa de Bancos de Sangre de los establecimientos del Ministerio de Salud, correspondiente a los años 2000 y 2001. Los resultados muestran un aumento de la prevalencia promedio nacional de 0,25% con un rango de 0.08 a 0.48% en el año 2000 a 0.60% con rango de 0.18 a 1.33% en el año 2001; estas cifras las consideramos como referenciales, desde el punto de vista epidemiológico, pues como sucede con este tipo de población, suele tener un sesgo en el sentido que en la muestra se repiten no solo donantes profesionales que conocen sus status con respecto a la infección por el virus de

hepatitis C, sino también otro grupo de donantes que conocen su condición de aptos por exámenes anteriores realizados por cualquier motivo.

Lo llamativo de estos resultados y que no es fácil explicar es el marcado incremento en la prevalencia entre el año 2,000 y el 2,001. Estos resultados por lo comentado en los párrafos anteriores ameritan la realización de estudios prospectivos con diseños rigurosos, que nos permitan conocer la verdadera prevalencia de la infección que presumiblemente sería mayor a las cifras encontradas en el presente reporte, por las razones expuestas anteriormente.

*Dr. Herman Vildozola G.
Comité Consultivo RGP*