

**Tabla 3.** Resultados del Grupo de Fisiología Gastrointestinal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Johns Hopkins

Grupo	Tratamiento	Nº Pacs.	Erradicación %	Nº días Tx
I	Amoxicilina 500 mg t.i.d. Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. Tinidazol 500 mg t.i.d.	61	22/45 (49%)	14 días
	Placebo	24	0/13	14 días
II	Tetraciclina 500 mg t.i.d. Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. Tinidazol 500 mg t.i.d.	66	32/54 (59%)	14 días
	Por 2 semanas adicionales: Tetraciclina 250 mg t.i.d. Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. Placebo	24	01/16	14 días
III	Amoxicilina 500 mg t.i.d. Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. Metronidazol 500 mg t.i.d.	51	19/34 (56%)	14 días
	Amoxicilina 500 mg t.i.d. Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. Furazolidona 100 mg t.i.d.	50	32/39 (82%)	14 días
Resultados del Grupo de Estudio De Idiáquez, Bussalleu, Cok				
I	Omeprazol 20 mg b.i.d. Claritromicina 500 mg b.i.d. Amoxicilina 1g b.i.d.	24	18/24 (75%)	7 días
II	Tetraciclina 500 mg q.i.d. Furazolidona 100 mg q.i.d. Subcittrato de Bismuto Coloidal 120 mg q.i.d.	19	18/19 (94.7%)	7 días
III	Tetraciclina 500 mg t.i.d. Furazolidona 100 mg t.i.d. Subcittrato de Bismuto Coloidal 120 mg t.i.d.	20	19/20 (95%)	10 días
Resultados del Grupo de Estudio Soto, Katz, Bautista, Razuri, Velapatiño, Gadea, Meza, Recavarren, Berg, Cadoz, Monath, Gilman y Taylor				
I	Omeprazol 20 mg b.i.d. Amoxicilina 1 g b.i.d. Claritromicina 500 mg b.i.d.	252	201/252 93%	14 días
Resultados del Grupo de Estudio Rodríguez Cuba W, Pareja A, Yushimito L, Ramírez Ramos A, Watanabe J, Rodríguez Ulloa C et al.				
I	Omeprazol 20 mg b.i.d. Amoxicilina 1 g b.i.d. Claritromicina 500 mg b.i.d.	36	31/36 86%	7 días
II	Omeprazol 20 mg b.i.d. Amoxicilina 1 g b.i.d. Claritromicina 500 mg b.i.d.	26	31/36 86%	10 días
Resultados del Grupo de Estudio de Paúcar, Arrunátegui, Cabello, Cok, Bussalleu				
I	Tetraciclina 2 g q.i.d. Furazolidona 400 mg q.i.d. Famotidina 40 mg una vez al día	14	12/14 85.7%	7 días 7 días 28 días
Resultados del Grupo de Estudio de Araujo, Bussalleu				
I	Tetraciclina 500 mg q.i.d. Furazolidona 100 mg q.i.d. Subcittrato de Bismuto coloidal 120 mg q.i.d.	34	30/34 88.2%	4 días 4 días 4 días
II	Tetraciclina 500 mg q.i.d. Furazolidona 100 mg q.i.d. Subcittrato de Bismuto coloidal 120 mg q.i.d.	34 3 días	23/34/ 68%	3 días 3 días