

Cuadro 2. Factores pronósticos anatomopatológicos de pacientes con cáncer gástrico avanzado con serosa expuesta.

Parámetros	Número de pacientes n= (%)	Sobrevida quinquenal (%)	Valor p *
Localización del tumor			0.0001
Tercio superior (U)	3 (2.2)	0.0	
Tercio medio (M)	23 (16.8)	4.4	
Tercio inferior (L)	111 (81.0)	19.4	
Forma macroscópica			NS
Borrmann I - II	27 (19.7)	30.9	
Borrmann III- IV	110 (80.3)	14.5	
Estado ganglionar regional (N)			0.03
N ₀	22 (16.1)	36.7	
N ₁	70 (51.1)	19.6	
N ₂	30 (21.9)	0.0	
N ₃	15 (10.9)	0.0	
Metástasis a distancia (M)			NS
M ₀	106 (77.4)	19.6	
M ₁	31 (22.6)	10.6	
Estadio Clínico (TNM)			0.0327
II	17 (12.4)	46.3	
III	81 (59.1)	14.5	
IV	39 (28.5)	11.8	
Metástasis hepática			NS
H ₀	132 (96.4)	16.9	
H (+)	5 (3.6)	0.0	
Tipo Histológico			NS
Intestinal	61 (44.5)	22.3	
Difuso	76 (55.5)	13.9	

(*) Test de log rank.