

ANEXO 1

**SCORE DE INTUBACION ENDOTRAQUEAL
ESCALA DE DAMUAL MEHTA MODIFICADA**

CUERDAS	ABIERTO	MOVIENDOSE	CERRANDOSE	CERRADAS
VOCALES	1	2	3	4
TOS	NO RPTA	ALGUNOS MOVI	ABUNDANTES	SEVEROS
	1	2	3	4
LARINGOS				
COPIA	1	2	3	4

Puntaje mínimo: 3 puntos.
Puntaje máximo: 12 puntos.

CONDICIONES DE INTUBACIÓN :

3	-	4	puntos:	Condiciones excelentes
5	-	7	puntos:	Condiciones buenas
8	-	10	puntos:	Condiciones pobres
11	-	12	puntos:	Condiciones pésimas.

ANEXO 2

PUNTUACIÓN STEWARD DE RECUPERACIÓN CLINICA

<i>CONCIENCIA</i>	<i>VENTILACIÓN</i>	<i>MOVIMIENTOS</i>	<i>PUNTOS</i>
<i>No respuesta</i>	<i>Requiere apoyo</i>	<i>Ninguno</i>	<i>0</i>
<i>Rpta a estímulos</i>	<i>Respira solo</i>	<i>Involuntarios</i>	<i>1</i>
<i>Despierto</i>	<i>Tose a la orden</i>	<i>Voluntarios</i>	<i>2</i>

Puntuación mínima: 0 puntos, Puntuación máxima: 6 puntos.

ANEXO 3

CALIDAD DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON ROCURONIO VS SUCCINILCOLINA EN CIRUGÍAS ABDOMINALES EN EL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA

Paciente:.....

Edad.....Sexo.....Peso.....

Fecha.....Cirugía.....

ASA.....Duración de la anestesia.....

Duración de la Cirugía.....Anestésico principal.....

	PA	FC
Inicial

Post Intubación
-----------------	-------	-------

Tipo de relajante
-------------------	-------	-------

Hora de administración del relajante

Hora de aparición de la 1ª y 2ª respuesta TOF.....

Hora de administración de la 2ª dosis.....

Hora de aparición de la 1ª y 2ª respuesta TOF.....

Hora de administración de la 3ª dosis.....

Hora de aparición de la 1ª y 2ª respuesta TOF.....

(Si solo se administró una dosis de rocuronio entonces):

Hora de aparición de la 3ª respuesta TOF.....

SCORE DE INTUBACIÓN(Marcar con un aspa)

Cuerdas Vocales	Abiertas	Moviéndose	Cerrándose	Cerradas
Tos	No Rpta	Algunos mov	Abundantes	Severos
Laringoscopia	Fácil	Regular	Difícil	Importante