

CUADRO N° 1

GRUPO DE PACIENTES SEGÚN EDAD

<i>EDAD</i> <i>(AÑOS)</i>	<i>PACIENTES</i> <i>GRUPO 1</i>	<i>PACIENTES</i> <i>GRUPO 2</i>	<i>TOTAL</i>	<i>PORCENTAJE</i>
<i>25 – 34</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>20</i>	<i>10%</i>
<i>35 – 44</i>	<i>30</i>	<i>18</i>	<i>48</i>	<i>24%</i>
<i>45 – 54</i>	<i>30</i>	<i>46</i>	<i>76</i>	<i>38%</i>
<i>55 – 64</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>32</i>	<i>16%</i>
<i>65 a más</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>24</i>	<i>12%</i>
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100%</i>

CUADRO N°2

GRUPOS DE PACIENTES SEGÚN SEXO

<i>SEXO</i>	<i>GRUPO</i>	<i>GRUPO</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
<i>MASCULINO</i>	23	17	40	20 %
<i>FEMENINO</i>	77	83	160	80 %
<i>TOTAL</i>	100	100	200	100 %

CUADRO N° 3

GRUPOS DE PACIENTES SEGÚN PESO

<i>PESO (kg)</i>	<i>GRUPO 1</i>	<i>GRUPO 2</i>	<i>TOTAL</i>	<i>PORCENTAJE</i>
<i>40 – 49</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>13</i>	<i>6.5 %</i>
<i>50 – 59</i>	<i>61</i>	<i>69</i>	<i>130</i>	<i>65.0 %</i>
<i>60 – 69</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	<i>42</i>	<i>21.0 %</i>
<i>70 a más</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>15</i>	<i>7.5 %</i>
<i>TOTAL</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100.0 %</i>

CUADRO N° 4

GRUPOS DE PACIENTES SEGÚN RIESGO ANESTESIOLOGICO

<i>ASA</i>	<i>GRUPO 1</i>	<i>GRUPO2</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
<i>I</i>	38	34	72	36 %
<i>II</i>	62	66	128	64 %
<i>TOTAL</i>	100	100	200	100 %

CUADRO N° 5

CALIDAD DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON SUCCINIL COLINA VERSUS BROMURO DE ROCURONIO SEGÚN LA ESCALA DE DAMUAL MEHTA MODIFICADA

<i>CALIDAD</i>	<i>GRUPO 1</i>		<i>GRUPO 2</i>	
	<i>PACIENTES</i>	<i>%</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>%</i>
<i>EXCELENTE</i>	98	98 %	93	93 %
<i>BUENO</i>	2	2 %	7	7 %
<i>REGULAR</i>	-	-	-	-
<i>POBRE</i>	-	-	-	-
<i>TOTAL</i>	100	100 %	100	100 %

CUADRO N° 6

**PUNTUACIÓN SEGÚN LA ESCALA DE DAMUAL MEHTA
MODIFICADA**

<i>PUNTAJE</i>	<i>GRUPO 1</i>		<i>GRUPO 2</i>	
	<i>PACIENTES</i>	<i>%</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>%</i>
<i>3 PUNTOS</i>	92	92%	77	77%
<i>4 PUNTOS</i>	8	8%	20	20%
<i>5 PUNTOS</i>	-	-	3	3%
<i>TOTAL</i>	100	100%	100	100%

CUADRO N° 7

**TIEMPO DESDE LA ADMINISTRACIÓN DEL BLOQUEADOR
NEUROMUSCULAR HASTA LA ABOLICIÓN DE RESPUESTA A LOS
ESTIMULOS SIMPLES DEL TOF GUARD.**

<i>TIEMPO (seg)</i>	<i>GRUPO 1</i>		<i>GRUPO 2</i>	
	<i>PACIENTES</i>	<i>%</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>%</i>
<i>45 – 49</i>	<i>50</i>	<i>50%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>50 – 54</i>	<i>43</i>	<i>43%</i>	<i>9</i>	<i>9%</i>
<i>55 – 60</i>	<i>7</i>	<i>7%</i>	<i>86</i>	<i>86%</i>
<i>más de 60</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>5%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>

CUADRO N° 8

**TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA PRIMERA DOSIS DE
BROMURO DE ROCURONIO HASTA LA PRIMERA RESPUESTA DEL
TOF.**

<i>TIEMPO</i>	<i>N° PACIENTES CON Br. de ROCURONIO</i>	<i>PORCENTAJE</i>
<i>20 – 24 minutos</i>	<i>13</i>	<i>13%</i>
<i>25 – 29 minutos</i>	<i>79</i>	<i>79%</i>
<i>30 – 34 minutos</i>	<i>7</i>	<i>7%</i>
<i>35 a más</i>	<i>1</i>	<i>1%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>

CUADRO N° 9

**TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE UNA DOSIS MINIMA DE
BROMURO DE ROCURONIO CON APARICION DE 3 RESPUESTAS
DEL TOF.**

<i>TIEMPO</i> <i>(minutos)</i>	<i>PACIENTES</i> <i>CON BR. ROCURONIO</i>	<i>%</i>
40 – 44	44	88%
45 – 49	5	10%
50 – 54	1	2%
Más de 55	-	-
<i>TOTAL</i>	50	100%

CUADRO N° 10

**TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS Y TERCERA DOSIS
ADICIONAL DE BROMURO DE ROCURONIO (0,15mg/kg).
(APARICION DE 2 RESPUESTAS AL TOF).**

<i>TIEMPO</i>	<i>SEGUNDA DOSIS</i>	<i>TERCERA DOSIS</i>
<i>20 – 24 minutos</i>	<i>65%</i>	<i>50%</i>
<i>25 – 29 minutos</i>	<i>33%</i>	<i>45%</i>
<i>Más de 30 minutos</i>	<i>2%</i>	<i>5%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>