

CAPÍTULO IV

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo, transversal y retrospectivo, realizado en el Instituto Materno Perinatal del total de casos de pacientes diagnosticadas con embarazo ectópico confirmado por anatomía patológica entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2001. Las mujeres con historia clínica no disponible o con información requerida incompleta fueron excluidas del análisis.

El embarazo ectópico se definió como la implantación del óvulo fecundado fuera del endometrio, lo que se confirmó por anatomía patológica.

Para cada mujer se recolectaron datos categóricos concernientes a edad, paridad, estado civil, procedencia, antecedente de embarazo ectópico, antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica, cirugía abdomino-pélvica previa, uso de dispositivo intrauterino, uso de progestágenos, abortos previos, antecedente de legrado uterino, uso de inductores de ovulación, tiempo de amenorrea, presencia de embarazo ectópico complicado, hemoglobina preoperatoria, shock hipovolémico, necesidad de transfusión sanguínea, localización del embarazo ectópico, localización del embarazo tubario, y tipo de cirugía.



Incidencia y perfil obstétrico y quirúrgico de pacientes con embarazo ectópico en el Instituto Materno perinatal. Enero - Diciembre 2001. De la Cruz Pacheco, Guillermo

Se definió embarazo ectópico complicado como los casos que presentaron rotura del embarazo ectópico, hemoperitoneo, anemia, shock hipovolémico o necesidad de transfusión sanguínea.

Para las variables edad y hemoglobina preoperatoria se determinaron las medianas y desviaciones estándar. Para el resto de variables se determinó frecuencias y porcentajes. El registro y análisis de datos se hizo con el programa estadístico SPSS 10,0.