

RESULTADOS

Luego de evaluar a 52 pacientes con Ascitis hospitalizados en cuatro salas de Medicina (Tres de varones y una de mujeres) del Hospital Nacional Dos de Mayo se obtuvieron los siguientes resultados:

Como era de esperar la población masculina fue mayoría con 47 casos 90.38%(tabla y cuadros N°1). La edad predominante fue la comprendida entre los 50-70 años con 36 (69.23%) (tabla y cuadrosN°2). Todos los pacientes estuvieron recibiendo tratamiento diurético siendo esto con Furosemida 10 (19.23%),Espironolactona 19 (36.52%) y ambos 23 (44.23%) (tabla y cuadros N°3). La causa clínicamente encontrada de Ascitis fue Cirrosis 50 (96.15%), otros 2 pacientes (3.85%) presentaron Neoplasia de Ovario (tabla y cuadros N°4). La distribución de pacientes en función a su grado de Presión Intrabdominal predominó en el grado II con 22 (44.31%) seguido del grado IV con 13 (25%) casos (tabla y cuadros N°5). Se encontró finalmente que en ningún caso los pacientes tuvieron valores de Depuración de Creatinina inferiores a 80 ml/min (tabla y cuadros N°6).

Tabla N° 1

Distribución de Pacientes Con Ascitis Según Sexo

| Sexo | N° | % |
|---------|----|-------|
| Hombres | 47 | 90.38 |
| Mujeres | 5 | 9.62 |
| Total | 52 | 100 |

Grafico N° 1




Tabla N° 2

Distribución de Pacientes Con Ascitis Según Edad

| Edad | N° | % |
|-------|----|-------|
| <30 | 4 | 7.69 |
| 30-50 | 4 | 7.69 |
| 50-70 | 36 | 69.23 |
| >70 | 8 | 15.38 |
| Total | 52 | 100 |

Grafico N° 2





Tabla N° 3

Distribución de Pacientes con Ascitis Según Uso de Diuréticos

| Diurético | N° | % |
|------------------------------|----|-------|
| Furosemida | 10 | 19.23 |
| Espironolactona | 19 | 36.53 |
| Furosemida + Espironolactona | 23 | 44.23 |
| Total | 52 | 100 |





Tabla N° 4

Distribución de Pacientes con Ascitis Según Etiología

| Enfermedad | N° | % |
|-------------------|----|-------|
| Cirrosis Hepática | 50 | 96.15 |
| NM de ovario | 2 | 3.85 |
| Total | 52 | 100 |




Tabla N° 5

Distribución de Pacientes con Ascitis Según Grado de Presión Intrabdominal

| Grado de PIA | N° | % |
|--------------|----|-------|
| I | 12 | 23.08 |
| II | 22 | 42.31 |
| III | 5 | 9.62 |
| IV | 13 | 25.00 |
| Total | 52 | 100 |

PIA: Presión Intrabdominal

Grafico N° 5





Tabla N°6

Distribución de Pacientes con Ascitis Según Depuración de Creatinina

| Depuración de Creatinina | N° | % |
|--------------------------|----|-----|
| 80 a 120 | 52 | 100 |
| 50 a 80 | 0 | 0 |
| 30 a 50 | 0 | 0 |
| 10 a 30 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 100 |

Grafico N° 6





Tabla N° 7

Presión Intrabdominal vs Depuración de Creatinina en Pacientes con Ascitis

| PIA \ DC | 80 a 120 | 50 a 80 | 30 a 50 | 10 a 30 | Total | % |
|----------|----------|---------|---------|---------|-------|--------|
| I | 12 | - | - | - | 12 | 23.08 |
| II | 22 | - | - | - | 22 | 42.31 |
| III | 5 | - | - | - | 5 | 9.62 |
| IV | 13 | - | - | - | 13 | 25.00 |
| Total | 52 | - | - | - | 52 | 100.00 |

Grafico N° 7

