

## **CONCLUSIONES:**

- La Biopsia Aspiración con Aguja Fina en nuestro medio, se establece como una metodología válida para hacer diagnóstico de los diferentes tipos de lesiones de las Glándulas Salivales; lo cual se sustenta en los valores de Sensibilidad y Especificidad encontrados en el estudio.
- La Biopsia Aspiración con Aguja Fina en Glándula Salivales proporciona un diagnóstico oportuno y normalmente puede ser informada dentro de las 24 horas, lo que contribuye en la decisión terapéutica y manejo del paciente.
- La validez de la BAAFSGS se encuentra dentro de los estándares internacionales, debido a que se cuenta con Anatomopatólogos de experiencia en la toma e interpretación de la muestra de este órgano.
- Obtener muestra suficiente se debe basar en la confianza de la colocación de la aguja en el sitio adecuado frente a la lesión, la preservación adecuada de las células y una correlación clínica adecuada.
- La literatura indica que las muestras inadecuadas no deben de exceder del 15%, los valores obtenidos en el estudio fueron de 5.3%, explicado por intervención directa del Anatomopatólogo en la toma de muestra, examen físico del paciente y acceso a la historia clínica.

- Diagnósticos falsos negativos estuvieron asociados a una citología insuficiente que fue sobre diagnosticada.