

INTRODUCCIÓN

La Eritrodermia o Dermatitis Exfoliativa es un desorden relativamente raro de la piel, que puede ser visto en pacientes, como una exacerbación de una enfermedad dermatológica pre-existente, como también puede indicar una enfermedad maligna de fondo.

El patrón del cuadro clínico se caracteriza por eritema generalizado y confluyente, además descamación, acompañado usualmente de linfadenopatía sistémica y fiebre.

Pacientes con dermatitis exfoliativa tienen pocas anomalías en los exámenes de laboratorio, la histología de la piel no específica y casi no hay cambios en los nódulos linfáticos y en la médula ósea.

La clasificación de la dermatitis exfoliativa fue hecha tempranamente por Baxter, quien definió una forma primaria y otra secundaria.

En la revisión de la Literatura encontramos que los investigadores encuentran mayormente una dermatosis de fondo en los pacientes con eritodermia, encontrándose también un grupo de causa no conocida llamado síndrome de hombre rojo. Encontrándose en menor porcentaje los casos atribuidos a drogas.

Nosotros realizamos la presente investigación, para determinar la frecuencia de su presentación en nuestro medio, y su probable etiología, encontrando que a diferencia de otros estudios, en el Hospital 2 de Mayo, que es donde realizamos este trabajo. La gran mayoría, (86.37%) de los casos de dermatitis exfoliativa estuvo en relación al uso de

medicamentos, siendo las drogas antituberculosas las mas comprometidas.

Consideramos que este trabajo contribuye a un mejor conocimiento de este desorden cutáneo, en nuestro medio. Sobretudo teniendo en cuenta la poca literatura encontrada, y por los hallazgos de estudio que reasaltan su asociación con la tuberculosis, enfermedad prevalente en nuestro País y con las drogas antituberculosas.