

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó el presente estudio tipo observacional y descriptivo. Se estudiaron 22 pacientes con Eritrodermia generalizada, que estuvieron hospitalizados en las salas de Medicina Interna del Hospital 2 de Mayo en el período 1992-2002.

Los pacientes fueron evaluados desde su ingreso por el Servicio de Dermatología, todos reunían el criterio indispensable de eritrodermia, cual es el enrojecimiento de la piel, el que afecta mas del 90% de la superficie del cuerpo. En la mayoría de casos se continuo con exfoliación de escamas, por lo que el término dermatitis exfoliativa, se usa algunas veces, como sinónimo. No obstante es necesario aclarar que la exfoliación puede ser ligera y el término dermatitis, sugiere la presencia de una reacción eczematosa, la cual no está necesariamente presente en la eritrodermia.

En nuestro trabajo el 100% de los pacientes presentaron eritrodermia, al momento de su inclusión en la investigación.

Todos los pacientes fueron evaluados clínicamente, con exámenes de laboratorio, radiografías, biopsias e inmunofluorescencia, esto último cuando las condiciones del paciente lo permitían.

Durante la evolución clínica los pacientes presentaron otros signos y síntomas ya descritos en la Literatura, como fiebre, prurito, adenopatías, malestar general, alopecia moderada a severa de cuero cabelludo, edema de piel, llegando hasta la fisuración de pliegues, con trasudación en algunos casos.

Dadas las condiciones socio-económicas de nuestros pacientes, en algunos casos no se les pudo realizar, todos los exámenes auxiliares necesarios, teniendo en cuenta que la población atendida en el Hospital 2 de Mayor es de bajos recursos económicos.