

## RESULTADOS

El 74.78% de pacientes estuvieron comprendidos entre 15 y 34 años; siendo el promedio de Edad 29.77 años (Tabla 1). Llamando la atención que la población adulta joven sea la más afectada.

El 90.9 % eran varones y el 9.09 % eran mujeres (Tabla 2), ésto nos da una relación de hombre/mujer de 10 a 1, mayor a otros estudios en que encuentran una relación de 6 a 1, explicable porque en el Hospital 2 de Mayo se atiende mayoritariamente a varones. El 9.09 % habían tenido episodios previos de dermatitis. El 4.54 % tuvo urticaria recidivante, y el 4.54 % atopia (Tabla 3).

El 63.63 % tenía TBC pulmonar y estaban en tratamiento anti-TBC. El 9.09% eran HIV positivo. Un paciente tenía Dermatitis Seborreica (4.54 %), otro paciente tenía Artritis y otro Meningitis 4.54%. El 13.63% no tenían otra enfermedad concomitante (Tabla 4).

La gran mayoría de pacientes (77.26%) tenían un tiempo de enfermedad entre 1-3 semanas de evolución; al momento de su hospitalización (Tabla 5).

Entre los síntomas y signos: la Eritrodermia estuvo presente en el 100% de pacientes; el 86.36% presentó prurito, el 59.09% tuvo fiebre. El 36.36% adenopatías, Edema de piel (36.36%) y Malestar general (36.36%) (Tabla 6).

En la gran mayoría de pacientes (86.37 %) la eritrodermia estuvo en relación con la ingesta de medicamentos: principalmente Anti-TBC, Sulfas, Fenitoína y Dicloxacilina. El 9.09% no tuvieron una causa conocida y el 4.54 % fue atribuido a Psoriasis. (Tabla 7).

El 54.54% de pacientes presentaban Leucocitosis y Eosinofilia; el 31.81% tenían anemia, mientras que el 22.72% desarrollaron Hiperbilirrubinemia (Tabla 8).

**Tabla 01: ERITRODERMIA SEGÚN EDAD**

EDAD (años)	Número	%
15 – 24	10	45.45
25 – 34	06	27.27
35 – 44	02	09.09
45 – 54	02	09.09
55 – 64	02	09.09
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**Tabla 02: ERITRODERMIA SEGÚN SEXO**

SEXO	Número	%
Masculino	20	90.90
Femenino	02	09.09
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**Tabla 03: ERITRODERMIA SEGÚN ANTECEDENTES PATOLOGICOS**

ANTECEDENTES	Número	%
Eritrodermia: episodio previo	02	09.09
Urticaria recidivante	01	04.54
Atopia – asma	01	04.54
Sin antecedentes	18	81.83
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**Tabla 04: ERITRODERMIA SEGÚN ENFERMEDADES CONCOMITANTES**

ENFERMEDAD CONCOMITANTE	Número	%
Tuberculosis	14	61
Dermatitis Seborreica	01	04
Artritis	01	04
Inmunodeficiencia Adquirida	02	09
Meningitis	01	04
Ninguna enfermedad	02	09
Psoriasis	01	04
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**Tabla 05: ERITRODERMIA SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD**

TIEMPO DE ENFERMEDAD	Número	%
Una semana	09	40
Dos semanas	02	09
Tres semanas	06	27
Cinco semanas	01	05
Seis semanas	01	05
Más de siete semanas	03	14
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**Tabla 06: ERITRODERMIA SEGÚN SIGNOS Y SINTOMAS**

SIGNOS Y SINTOMAS	Número	%
Eritrodermia	22	100
Prurito	19	86.36
Fiebre	13	59.09
Adenopatías	08	36.36
Edema de piel	08	36.36
Malestar general	08	36.36
Hepatomegalia	04	18.18
Ictericia	04	18.18

**Tabla 07: ERITRODERMIA SEGÚN ETIOLOGIA**


ETIOLOGIA	Número	%
<b>POR DROGAS:</b>	<b>19</b>	<b>86.35</b>
Anti TBC	14	63.63
Sulfas	02	09.09
Fenitoina	02	09.09
Dicloxacilina	01	04.54
<b>IDIOPATICA</b>	<b>02</b>	<b>09.09</b>
<b>PSORIASIS</b>	<b>01</b>	<b>04.54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>99.98</b>

**Tabla 08: ERITRODERMIA SEGÚN EXAMENES DE LABORATORIO**



LABORATORIO	Número	%
<b>Leucocitosis</b>	<b>12</b>	<b>54.54</b>
<b>Eosinofilia</b>	<b>12</b>	<b>54.54</b>
<b>Anemia</b>	<b>07</b>	<b>31.81</b>
<b>Hiperbilirrubinemia</b>	<b>05</b>	<b>22.72</b>
<b>Hipertransaminasemia</b>	<b>03</b>	<b>13.63</b>
<b>Hemograma Normal</b>	<b>05</b>	<b>22.72</b>

<b>LABORATORIO</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
Leucocitosis	12	54.54
Eosinofilia	12	54.54
Anemia	07	31.81
Hiperbilirrubinemia	05	22.72
Hipertransaminasemia	03	13.63
Hemograma Normal	05	22.72

# ERITRODERMIA SEGUN EDAD (TABLA No. 01)




# EITRODERMIA SEGUN SEXO (TABLA N° 02)







## ERITRODERMIA SEGUN ANTECEDENTES PATOLOGICOS (TABLA No. 03)



## ERITRODERMIA SEGUN ENFERMEDADES CONCOMITANTES (TABLA No 04)



# ERITRODERMIA SEGUN TIEMPO DE ENFERMEDAD (TABLA No. 05)





TABLA 06: ERITRODERMIA SEGUN SIGNOS Y SINTOMAS



# ERITRODERMIA SEGUN ETIOLOGIA (TABLA N° 07)




TABLA 08: ERITRODERMIA SEGUN EXAMENES DE LABORATORIO

