

## **MATERIALES Y METODOS**

El presente trabajo se realizó en el servicio de cirugía del Hospital de Apoyo La Merced, de la provincia de Chanchamayo, que cuenta con la capacidad de 60 camas. El estudio es de tipo retrospectivo, descriptivo de los pacientes admitidos con el diagnóstico de vólvulo de sigmoides entre el 1° de enero del 1995 al 31 de diciembre del 2001.

Se revisaron los libros de reporte operatorio, confeccionando una lista de pacientes intervenidos por vólvulo de sigmoides, procediendo luego a la revisión de las historias clínicas.

Los datos fueron recolectados en una ficha previamente estructurada en la que se tomaron en cuenta diferentes variables como edad, sexo, procedencia, ocupación, síntomas, tipo de procedimiento quirúrgico realizado, complicaciones y mortalidad.

### **Criterios de inclusión :**

- Pacientes operados por vólvulo de sigmoides.
- Pacientes cuya historia clínica presenta información legible y suficiente para los objetivos del estudio.

### **Criterios de exclusión:**

- Pacientes con devolvulación espontánea, por sonda rectal no sometidos a cirugía.
- Pacientes con diagnóstico de VS fallecidos en fase preoperatoria.
- Pacientes cuya historia clínica presenta información insuficiente o no fue ubicada en el archivo.

Siguiendo la metodología anterior se obtuvo una lista de 98 pacientes operados de obstrucción intestinal, de los cuales 38 fueron operados de vólvulo de sigmoides, los cuales cumplieron los criterios de inclusión.

Previo análisis de los datos recolectados se presentaron los resultados en cuadros estadísticos y gráficos, respecto a cada variable considerada en el estudio que nos permita concluir y responder a los objetivos planteados.