

## II RESUMEN

### **TITULO: EPIDEMIOLOGIA DE LA MUERTE FETAL INTRAUTERINO EN EL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ 2002**

**OBJETIVOS:** Determinar los aspectos epidemiológicos de la muerte intrauterina

**METODOLOGÍA:** Estudio retrospectivo descriptivo, de acuerdo al enfoque de las manifestaciones colectivas

**MATERIAL Y METODOS:** La población fueron todas las gestantes atendidas durante el periodo 2002 en el servicio de ginecoobstetricia del Hospital San Bartolomé, las cuales fueron 6166 embarazadas, con un total de recién nacidos vivos más muertos de 6,228, la muestra correspondió a 53 gestantes cuyos productos terminaron como muerte intrauterina. La forma de recolección de los datos fue a través del sistema informático perinatal, las historias clínicas, el libro de registro de partos y la oficina de estadística. Para fines del procesamiento de los datos, estos fueron recogidos en una hoja de registro para luego ser analizados en tablas matriciales.

**RESULTADOS :** La tasa de muerte intrauterina fue de 8.5 x 1000, ; El grupo etáreo comprendido entre 21 y 35 años tuvo el 62.1 % de todas las muertes intrauterinas ; El 53% de las muertes intrauterinas tuvieron control prenatal; La edad gestacional menor de 37 sem correspondió al 69.9% ; El peso de los productos de la muerte intrauterina fueron en un 69.9% menores de 2kilos; El 70% de la culminación de la gestación fue por vía vaginal; La morbilidad asociada con mayor frecuencia fue Las hemorragias, Ruptura prematura de membranas, Pre eclampsia; El 11.3% terminó en la unidad de cuidados intermedios

### **CONCLUSIONES**

Los datos epidemiológicos nos muestran que el grupo en edad fértil son los más afectados que tuvieron control prenatal la mayoría, el grado de instrucción no es problema, los pretérmino son los más afectados, la vía de culminación más frecuente fue la vaginal, la morbilidad más asociada fue las hemorragias y hay pacientes que terminan en la unidad de cuidados intermedios

Palabras claves: Muerte intrauterina