



Eficacia del Misoprostol en aborto frustrado y gestación no evolutiva en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins EsSalud Lima (Enero 1998 - 1999). Huamán Páucar, César Augusto; Caracela Núñez, César Longinos

RESUMEN

Se presenta un estudio retrospectivo descriptivo constituido por 1672 pacientes con diagnóstico clínico y ecográfico de aborto frustrado y gestación no evolutiva de las cuales 608 pacientes fueron tratados con Misoprostol intracervical, fondo de saco posterior y vía oral, como fármaco de elección para la maduración y evacuación uterina del producto, realizado en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins -EsSalud, Lima Enero 1998-Diciembre 1999. El motivo de estudio fue comprobar la eficacia del Misoprostol en aborto frustrado y gestación no evolutiva.

Los resultados muestran que de un total de 608 casos estudiados a las cuales se les administró misoprostol, se presentó un 41.5% (252 casos) con el diagnóstico de aborto frustrado y un 58.5% ó (356 casos) con el diagnóstico de gestación no evolutiva, siendo la mayoría de porcentajes 31.58% a una edad entre 30-34 años, comprendida a una edad promedio 32.7 años; un 67.10% de las pacientes fueron multíparas; en una edad gestacional comprendida de 9-12 semanas 58.55%; siendo



la dosis más usada de 600 mcg 66.45%; por la vía de administración que fue la intracervical más oral 75.66% aun tiempo de latencia desde la administración del misoprostol hasta lograr resultados 6-10 horas 50%.

Por lo que el 57.89% de las pacientes presentaron sangrado en cantidad escasa; manifestando dolor un 91.45% de las pacientes; llegando a un resultado final el 76.95% de las pacientes logró maduración cervical con una dilatación de al menos 8 mm. sin expulsión del feto.

Podemos decir que el misoprostol es un fármaco útil, de probada eficacia dando como resultados (77.78%) en gestantes con aborto frustrado y (76.40%) en gestantes con gestación no evolutiva; generalmente en dosis de 600 mcg (66.45%) que evita el preoperatorio efectivo, acorta la estancia hospitalaria, proporcionando adecuados beneficios a costo bajo (relación costo beneficio), en el tratamiento de las pacientes con aborto frustrado y gestación no evolutiva en un tiempo menor.



SUMMARY

A descriptive retrospective study is presented constituted by 1672 patients with clinical diagnosis and abortion ecográfico I frustrate and non evolutionary gestation of which 608 patients were treated with Misoprostol intracervical, bottom of later sack and via oral, as election pharmacy for the maturation and uterine evacuation of the product, carried out in the service of Gineco Obstetrics of the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins, -it is Health, Lima January 1998 - December 1999. -The study reason was to check the effectiveness of the Misoprostol in abortion I frustrate and non evolutionary gestation.

The results show that of to total of 608 marry studied which "were administered misoprostol, 41.5%, it was presented (252 marry) with the abortion diagnosis I frustrates you and 58.5% (356 marry) with the diagnosis of non evolutionary gestation, being most from percentages 31.58% to an age among 30-34 years, understood to an age average 32.7 years; 67.10% of the patients was multíparas; in an age understood gestacional of 9-12 weeks 58.55%; being the used dose in 600 mcg 6.45%; for the administration road that was the intracervical oral 75.66% at the same lives it cheats of latency from the administration of the misoprostol until achieving results 6-10 hours 50%.



Eficacia del Misoprostol en aborto frustrado y gestación no evolutiva en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins EsSalud Lima (Enero 1998 - 1999). Huamán Páucar, César Augusto; Caracela Núñez, César Longinos

For what 57.89% of the patients presented bled in scarce quantity; manifesting pain 91.45% of the patients; arriving to final result 76.95% of the.